

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



---

**FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y OBSTÉTRICOS  
EN ADOLESCENTES RELACIONADO AL RECIEN  
NACIDO PRETÉRMINO. HOSPITAL LA CALETA.  
CHIMBOTE, 2012.**

---

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  
DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**TESISTAS:**

**Bach. Enf. ALVAREZ RUIZ, DIANA KARINA.**

**Bach. Enf. SEVILLANO JARA, DEISY ARACELI.**

**ASESORA:**

**Dra. SERRANO VALDERRAMA, CARMEN.**

**NUEVO CHIMBOTE – PERÚ  
2012**

## RESUMEN

Investigación retrospectivo de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, el objetivo general fue conocer los factores de riesgo maternos y obstétricos en adolescentes relacionado al recién nacido pretérmino. Hospital La Caleta. Chimbote, 2011. La muestra estuvo conformada por 53 adolescentes que reunieron los criterios de inclusión. La recolección de datos se utilizó 2 instrumentos: factores de riesgo maternos, obstétricos y del recién nacido pretérmino. La información obtenida fue procesada en el programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS) versión 18 y se presentan en cuadro de una y doble entrada utilizándose la prueba de Chi cuadrado para el análisis estadístico. Los resultados fueron:

- El 67.9% son recién nacidos pretérmino leve (34-36 semanas), el 20.8% pretérmino moderado (32-33 semanas) y 11.3 % pretérmino extremo (28 -31 semanas).
- Los factores de riesgo maternos: edad, grado de instrucción, tenencia de pareja y residencia no presentaron relación estadística significativa con el recién nacido pretérmino.
- El factor de riesgo obstétrico: control prenatal si presento relación estadísticamente significativa. La paridad, el intervalo intergenésico, los antecedentes obstétricos y las complicaciones obstétricas no presentaron relación estadísticamente significativa.

Palabras claves: Riesgo materno obstétrico, pretérmino