

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**

## **FACULTAD DE CIENCIAS**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



---

**ANTECEDENTES SOCIALES Y OBSTÉTRICOS MATERNOS RELACIONADOS AL  
APGAR DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO. HOSPITAL ELEAZAR GUZMÁN  
BARRÓN. NUEVO CHIMBOTE, 2012"**

---

### **TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**TESISTAS :** Bach. ROMÁN REYES, Gabriela Lizzeth  
Bach. ROSALES SANTOS, Karen Leonor

**ASESORA :** Dra. SERRANO VALDERRAMA, Luz Carmen

**NUEVO CHIMBOTE - PERÚ**

**2013**

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, tiene como objetivo general conocer los antecedentes sociales y obstétricos maternos relacionados al apgar del recién nacido pretérmino. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2012.

La población de estudio estuvo constituida por 103 madres y sus respectivos neonatos pretérminos que nacieron de Enero a Junio del año 2012 en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de análisis de contenidos, instrumento fue la ficha de recolección de datos Antecedentes sociales y obstétricos maternos relacionados al apgar del recién nacido pretérmino. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el Programa Software SPSS 18, en dos niveles: descriptivo y analítico, llegando a las siguientes conclusiones:

El 48.5% de las madres tienen entre 20 a 29 años, el 58,3% estudió nivel secundario; el 97,1% con pareja, el 38,8% residen en zona urbana, el 93.2% no consume sustancia tóxicas, el 57.3% son multíparas, el 60.2% presentaron control prenatal inadecuado, el 52.4% tienen intervalo intergenésico mayor de dos años, el 66% no presentaron antecedentes patológicos, el 79.6% de recién nacidos fueron pretérmino leves, el 61.2% no registraron antecedentes en embarazos anteriores y el 63.1% no presentaron complicaciones obstétricas.

El 86,4% de recién nacidos pretérmino presentaron apgar normal (7-10 puntos); el 8,7% depresión moderada (4-6 puntos) y el 4,9% asfixia severa (0-3 puntos).

No se encontró relación estadística significativa al relacionar los antecedentes sociales y obstétricos maternos con el apgar del recién nacido pretérmino

*Palabras claves:* Edad gestacional, Apgar del recién nacido pretérmino.